MMC DRUGS TEST

TOEPASSING:
De test kan worden gebruikt voor het presumptief aantonen van Drugs, Derivaten hiervan en precursoren.

GEVOELIGHEID:
De gevoeligheid (Lower detection Level) is < 0,3mg afhankelijk van de zuiverheid van het te testen materiaal.

KLEUROMSLAG:
Bij de aanwezigheid van drugs of derivaten /precursoren zal de kleuromslag overgaan zoals op de ampullen en of doosje is aangegeven.
Reactie tijd: De reactie (kleuromslag) zal al na enkele seconden zichtbaar worden. Het aflezen van de test moet binnen 5 minuten plaatsvinden. Na het gebruik de ampul met het plastic dopje sluiten. De spatel moet altijd schoon zijn dus het is raadzaam steeds een nieuwe spatel te nemen.

SPECIFICATIE:
De aanwezigheid van drugs en precursoren zal de test verkleuren. Ook sommige geneesmiddelen kunnen een gelijke of een andere verkleuring veroorzaken.

HOUDBAARHEID:
De ampullen niet blootstellen aan direct zonlicht.
Temperaturen -20ºC (-68ºF) +57ºC (+135ºF)

VEILIGHEID:
Houdt de ampullen buiten bereik van kinderen. In het geval dat het reagens (Kristallen) in contact komen met ogen, huid of kleding, spoel het dan met water)
De producent is niet verantwoordelijk voor incorrect gebruik.

VERPAKKING:
01 GEBRUIKSAANWIJZING, 10 AMPULLEN, 10 SPATELS

Stap 1:

Tik de ampul een paar keer op een tafel of ander hard voorwerp zodat de kristallen naar beneden vallen. Houd het plastic kapje tussen duim en wijsvinger.

Stap 2:

Breek de top van de ampul.

Stap 3a:

1

Gebruik het bijgeleverde spateltje om het materiaal direct in de ampul te brengen(1) of in het plastic kapje (2).

2

Stap 3b:

Gebruik voor materialen in vloeibare vorm (bijv. "GHB") een pipetje en breng een druppeltje in de ampul.

Stap 4:

Boven in het plastic kapje bewind zich bij de LSD / Cannabis / V&R / Ketamine Test een katalysator korrel welke na het inbrengen van de te testen substantie moet worden toegevoegd.

Let op! Wanneer het balletje in het kapje tegen de rand aanplakt, gebruik dan een spateltje om deze in de ampul te laten vallen en daarna te mixen.

Stap 5:

Plaats het kapje weer terug op de open ampul.

Stap 6:

Controleer de kleur met de kleur zoals gedrukt op de ampul.

Stap 7:

Daar de MMC testen tijdens het gebruik al geheel geneutraliseerd zijn, kunt u na gebruik de test deponeren in de glasbak.

MMC PRESUMPTIVE NARCOTIC SCREENING TESTS

APPLICATION:
Used as a presumptive test to detect the presence of narcotics and precursors.

SENSITIVITY:
The test has a sensitivity; LDL (Lower Detection Level) of approx. < 0,3 mg depending on the purity of the sample.

COLOR REACTION:
The presence of narcotics is similarly indicated by a change in colour.
In addition various medicines can produce similar or different colours.
In all cases the colour change is fully developed within 1-5 minutes, further elapse of time produces only a slight colour change depending of the colour.
The test should be evaluated after 5 minutes have elapsed.

STORAGE:
How to store the ampoules:
The shelf life is indicated on the package. The ampoules should be protected from light.
Temperatures -20ºC (-68ºF) +57 ºC (+135ºF)

SAFETY:
Keep the ampoules out of the reach of children.
In case the crystals come in contact with the eyes, skin or clothes, the effected areas have to be rinsed with water.
Note: No Liability can be accepted by the manufacturer / supplier, when the tests have been inappropriately used.

DISPOSAL:
After use the ampoules we recommend to dispose the test ampoules into the bottle bank or in accordance with the waste Disposal regulations current in the country use.

PACKING:
10 TEST AMPOULES, 10 SPATULAS, 1 INSTRUCTION SHEET

Step 1:

Knock the unopened ampoule several times against a hard surface, so the granules which may be sticking to the inside of the ampoule wall will fall downwards.

Step 2:

Take the top of the ampoule between the thumb and index finger and snap off the top with the ampoule breaker

Step 3a:

1

Use the spatula to insert the suspect material into the ampoule (1) or into the plastic cap (2)

2

Step 3b:

For suspect samples in liquid form such as GHB, we advise to use the round end of the supplied spatula or otherwise use a pipette and insert one drop into the ampoule.

Step 4:

With the MMC LSD / Cannabis / V&R and Ketamine Test, the plastic lid contains a catalyst grain which, once the material to be tested is inserted in the ampoule, must be mixed using the round tip of the spatula.

Attention! If the ball in the cap sticks against the side, please use a spatula to take it out and, put it in the ampoule and mix it.

Step 5:

Place the plastic cap on top of the ampoule

Step 6:

Compare the color from the reagent-granulate with the color line printed on the ampoule.

Step 7:

Since the MMC Tests does not require acid neutralizers (as this is automatically done within the ampoule) you may throw the used ampoules in the trash or glass bin.

MMC NARCOTIQUES TEST

APPLICATION:
Le test peut être utilisé pour l'identification, entre autres, de la Narcotiques, Précurseurs ainsi que des produits en dérivant.

SENSIBILITE:
La sensibilité (Lower detection Level) est < 0,3 mg en fonction de la pureté de la substance à tester.

CHANGEMENT DE COULEUR:
Lors de la présence de narcotiques, Précurseurs ou de produits dérivés, la couleur se transformera
(Déprimée comme sur l'ampoule et l'emballage)
Temps de réaction: la réaction (changement de couleur) se manifestera déjà après quelques secondes. La lecture du test doit avoir lieu dans l'espace de 5 minutes. Lors de la présence de narcotiques. Après l'usage, fermez l'ampoule avec le capuchon en plastique. La spatule doit toujours être propre, il est donc recommandé de prendre à chaque fois une nouvelle spatule.

SPECIFICATION:
La présence de narcotiques, la couleur déprimée comme sur l'ampoule et l'emballage Des médicaments peuvent provoquer une décoloration pareille ou différente.

DUREE DE CONSERVATION:
N'exposez pas les ampoules à la lumière directe du soleil
Températures -20ºC (-68ºF) +57 ºC (+135ºF)

SECURITE:
Tenez les ampoules hors de portée des enfants. Dans le cas où le réactif (cristaux) entre en contact avec les yeux, la peau ou des vêtements, rincez alors avec de l'eau.
La responsabilité n'incombe pas au producteur en cas d'une utilisation incorrecte.

EMBALLAGE:
01 MODE D'EMPLOI, 10 AMPOULES, 10 SPATULES

Étape 1:

Placez le capuchon devant vous comme le montre l'image. Tapez avec l'ampoule plusieurs fois sur une table ou un autre objet dur de sorte que les cristaux tombent en bas.

Étape 2:

Prenez l'ampoule entre le pouce et l'index et brisez la tête (soudure).

Étape 3a:

1

Utilisez la spatule pour introduire la substance suspecte dans l'ampoule (1), ou dans le capuchon en plastique (2)

2

Étape 3b:

Pour les substances suspectes en liquide (comme p.e. la GHB), utilisez les pipettes fournies et mettez une goutte dans l'ampoule.

Étape 4:

Un petit grain catalytique se trouve dans le couvercle en plastique du test MMC LSD / Cannabis / V&R / Kétamine qui doivent être mélangé dans l'ampoule avec l'extrémité arrondie de la spatule après le remplissage du matériel à tester.

Attention : si la « boule » reste coller sur le couvercle, utiliser une spatule pour la récupérer . Insérer la dans l'ampoule et mélanger.

Étape 5:

Posez le capuchon en plastique sur l'ampoule

Étape 6:

Comparez la couleur avec le codage par couleur imprimé sur l'ampoule.

Étape 7:

Les tests MMC n'utilisant pas d'acide neutralisant, vous pouvez les jeter dans la poubelle commune des déchets ménagers.

MMC RAUSCHGIFTTESTS

ANWENDUNG:
Mit diesem Test können unter anderem Rausgibt und deren Derivate (precursoren) nachgewiesen werden.

SENSIBILITÄT:
Die Sensibilität (Lower Detection Level) beträgt < 0,3 mg. Sie ist von der Reinheit des Testmaterials abhängig.

FARBVERÄNDERUNG:
Reaktionszeit: Die Reaktion (Veränderung der Farbe) tritt schon nach wenigen Sekunden ein.
Der Test hat innerhalb von fünf Minuten abgelesen zu werden.
Nach der Anwendung wird die Ampulle mit der Plastikkappe wieder verschlossen. Der Spatel hat immer sauber zu sein, es wird aus diesem Grund empfohlen, bei jedem Test einen neuen Spatel zu verwenden.

SPEZIFIKATION:
Das Vorhandensein von Arzneimittel können dieselbe oder eine andere Verfärbung verursachen.*

HALTBARKEIT:
Die Ampullen dürfen nicht ins Sonnenlicht gestellt werden.
Temperaturen -20°C (-68°F) +57 °C (+135°F)

SICHERHEIT:
Die Ampullen außer Reichweite von Kindern halten. Bei Kontakt des Reagenzmittels (Kristalle) mit Augen, Haut oder Kleidung sofort mit Wasser spülen.
Der Produzent haftet nicht für unsachgemäße Verwendung.

VERPACKUNG:
01 GEBRAUCHSVORSCHRIFT, 10 AMPULLEN, 10 SPATEL

Schritt 1:

Stellen Sie die Kappe wie abgebildet auf. Klopfen Sie die Ampulle ein paar Mal leicht auf einen Tisch oder eine andere feste Unterlage, damit die Kristalle nach unten in die Ampulle fallen.

Schritt 2:

Halten Sie die Ampulle zwischen dem Daumen und Zeigefinger fest und brechen Sie die Spitze am genarbten Rand ab

Schritt 3a:

1
Mit dem Spatel können Sie das verdächtigte Material in die Ampulle geben (1) Oder in die Plastikkappe geben (2)

2

Schritt 3b:

Benützen Sie bei verdächtigtem und flüssigem Material (wie zum Beispiel GHB) die mitgelieferte Pipette und geben Sie einen Tropfen in die Ampulle.

Schritt 4:

Vorsicht! Falls das Kügelchen in der Verschlusskappe an der Seite klebt: es muss mittels Spatel herausgenommen, in die die Ampulle gegeben und vermischt werden.
Im Kunststoff verschluss des MMC LSD/ Cannabis / V&R und Ketamine Tests befindet sich Katalysator Korn, die nach dem Füllen mit dem zu prüfenden Material mit dem runden Ende des Spachtels in der Ampulle gemischt werden müssen.

Schritt 5:

Verschließen Sie wieder mit der Plastikkappe die Ampulle

Schritt 6:

Vergleichen Sie die Farbe mit der Farbskala auf der Ampulle

Schritt 7:

Da die MMC-tests ist es nicht erforderlich Säure „neutralizers" (da dies automatisch geschieht in der Ampulle), die Sie Wurf Mai die verwendeten Ampullen in den Papierkorb.

MMC NARCOTICI TEST

APPLICAZIONE:
Si può utilizzare il test per accertare la presenza di, fra l'altro, Narcotica, precursori e i loro prodotti derivati.

SENSIBILITA:
La sensibilità (Lower detection Level) è < 0,3 mg e dipende dalla purezza della sostanza da testare.

ALTERAZIONE DI COLORE:
Nel caso della presenza di narcotici, precursori o i loro derivati, il colore andrà dal giallo chiaro. stampato sull'ampolla o sull'imballaggio.

Tempo di reazione: La reazione (alterazione di colori) sarà visibile già dopo alcuni secondi. La lettura del test deve avvenire entro i cinque minuti. Dopo l'uso, fermare l'ampolla con il tappo di plastica. Siccome la spatola deve sempre essere pulita, si consiglia di utilizzare sempre una nuova spatola.

SPECIFICAZIONE:
La presenza di narcotica /precursori, colore come stampato sull'ampolla o sull'imballaggio. Le medicine possono condurre a un'alterazione di colore simile o diversa.

CONSERVAZIONE:
Non esponete mai le ampolle alla luce del sole diretta
Temperature -20°C (-68°F) +57 °C (+135°F)

SICUREZZA:
Conservate le ampolle fuori della portata dei bambini. Nel caso in cui il reagente (Cristalli) vengono in contatto con gli occhi, la pelle o i vestiti, lavatelo via con acqua.
Il produttore non è responsabile di usi scorretti.

IMBALLAGGIO:
01 ISTRUZIONI PER L'USO, 10 AMPOLLE, 10 SPATOLE

Fase 1:

Battete lampolla alcune volte su una tavola o contro un altro oggetto duro in modo che i cristalli affondino.

Fase 2:

Prendete lampolla tra il pollice e lindice e spezzate la parte superiore (anello di rottura).

Fase 3a:

1
Utiiizzate una spatola per mettere la sostanza sospetta nellampolla (1). Oppure nel cappuccio di plastica (2).

2

Fase 3b:

Utilizzate le pipette per le sostanze sospette in forma liquida (come, per esempio, il GHB) e mettete una goccia nellampolla.

Fase 4:

Attenzione ! Se la pallina contenute nel coperchio s'incolla sul lato dello stesso, estraetela con la spatolina in dotazione, mettetela nell'ampolla e procedete alla mescola.
Con il test dell'LSD / Cannabis / V&R / Ketamine della ditta MMC, il coperchio di plastica contiene una grano catalizzatore che devono essere mescolato utilizzando la punta rotonda della spatola, dopo che il materiale da analizzare è stato inserito nell'ampolla.

Fase 5:

Mettete il cappuccio di plastica sullampolla.

Fase 6:

Paragonate il colore al colore indicato sullampolla.

Fase 7:

Dato che la MMC test non richiede acido neutralizers (come questo è fatto automaticamente all'interno della fiala) si può buttare la fiale utilizzati nel cestino o bidone di vetro.

MMC NARCOTICA TEST

APLICACIONES:
Este test se puede utilizar para la detección de Narcótica, precursora , entre otras sustancias, así como derivados de esas drogas.

SENSIBILIDAD:
La sensibilidad (Nivel Mínimo de Detección) es de < 0,3 mg., dependiendo de la pureza del material sometido a análisis.

CAMBIO DE COLOR:
Si la sustancia analizada contiene Narcótica , precursora o derivados suyos, se observará un cambio de color del ampolla /caja.
Tiempo de reacción: La reacción (cambio de color) se podrá observar a los pocos segundos. Los resultados del test se deberán leer en los 5 minutos siguientes. Una vez utilizada la ampolla, deberá taparse con la tapa de plástico. La espátula deberá estar siempre perfectamente limpia, por lo que es recomendable usar una espátula nueva en cada análisis.

ESPECIFICACIONES:
La Narcótica, precursora o derivados, Los medicamentos pueden producir el mismo color u otro color.

MODO DE CONSERVACIÓN:
No exponer las ampollas a la luz directa del sol
Temperaturas: -20°C (-68°F) +57 °C (+135°F)

SEGURIDAD:
Mantenga las ampollas fuera del alcance de los niños. Si el reactivo (los cristales) cae en los ojos, en la piel o en la ropa, deberán enjuagarse con abundante agua.
El fabricante no se hace responsable del uso incorrecto del test.

EMBALAJE:
01 INSTRUCCIONES DE USO, 10 AMPOLLAS, 10 ESPÁTULAS

Paso 1:

Golpee la ampolla un par de veces contra una mes u otro objeto duro, de modo que los cristales caigan al fondo.

Paso 2:

Sujete la ampolla entre el pulgar y el índice y rompa el extremo indicado (junta de soldadura)

Paso 3a:

1
Utilice la espátula para introducir la sustancia sospechosa en la ampolla. (1)
0 en la tapa de plástico (2)

2

Paso 3b:

Para las sustancias liquidas (por ejemplo, el GHB), utilice las pipetas suministradas, vertiendo con ella una gotita dentro de la ampolla.

Paso 4:

Atencion! Para la correcto desarrollo di test, debe introducirse la microesfera que se encuentra dentro de la tapa plástica, en la ampolla de vidrio, y mezclar con la sustancia desconocida objeto del test. En el caso que la microesfera estuviese adherida a la pared de la tapa, se la debe despegar mediante el uso de una espátula para poderla introducir en la ampolla.
En el test de MMC, LSD / Cannabis / V&R / Ketamine, la tapa de plástico contiene una pequeña cantidad de un grano catalizador que deben ser mezclado con el pico redondeado de la espátula en cuanto el material se insierta en la ampolla.

Paso 5:

Coloque la tapa de plástico en la ampolla

Paso 6:

Compare el color que se obtenga con la gama de colores que se muestra en la ampolla

Paso 7:

Desde la MMC Pruebas no requiere el neutralizador de ácidos (ya que se trata de hacer automáticamente dentro de la ampolla) que puede plantear el uso ampollas en la basura bin o vidrio.